Agarosa D1 Baja EEO

Cat. 8010

Para electroforesis analítica, blotting o electroforesis de proteínas como la inmunodifusión radial.

Información práctica

Industria: Medios de cultivo para Biología molecular / PCR y Electroforesis / Clonaje / Proteómica

Principios y usos

La Agarosa D1 Baja EEO se utiliza en electroforesis analítica y preparativa de ácido nucleico, blotting o electroforesis de proteínas como la inmunodifusión radial.

Algunas de sus características importantes son:
- Extraordinaria resistencia mecánica para un manejo más confiable y fácil.
- Posibilidad de variar el tamaño de poro de acuerdo con
tamaño de partícula mediante la modificación de la concentración de gel.
- Fácil preparación del gel por dilución simple en tampones acuosos mediante hervido estándar o en el microondas.
- Mayor estabilidad térmica debido a la alta histéresis (diferencia entre las temperaturas de gelificación y fusión).
- Excelente transparencia del gel y alta visibilidad.
- Absorción excepcionalmente baja de agentes de tinción.
- Ausencia de toxicidad (poliacrilamida es neurotóxico).

Características físico-químicas

Descripción	Especificación
Cenizas	<= 0,4%
Claridad 1,5 % (NTU)	<= 3
Fuerza de gel 1% (g/cm2)	>=1200 g/cm2
Fuerza de gel 1,5% (g/cm2)	>= 2500 g/cm2
Temperatura gelificación 1,5% (ºC)	36±1,5 ºC
Temperatura fusión 1,5% (ºC)	88±1,5 ºC
Actividad DNasa/RNasa	No detectada
EEO	0,05-0,13
Humedad	<= 10%
Fondo de gel	Muy bajo
Color	Blanco
Apariencia	Polvo fino, homogéneo
Resolución DNA	Buena resolución
Sulfatos	<= 0,10%

Almacenamiento

Temp. Min.:2 ºC
Temp. Max.:25 ºC