ESPECIFICACIÓNES

PAPANICOLAOU

Catálogo: 64294

Especificación: Método de tinción de citología exfoliativa e histología.

Presentación: Equipo e individual

Finalidad:

Método de tinción para frotis celulares que sirve para diagnosticar y apreciar la citomorfologia primaria núcleo-citoplasma) así como agentes patógenos y proliferativos, procesos inflamatorios, infecciones por parásitos, virus, hongos, bacterias e identificación de la maduración celular.

Metodologia:

La citología exfoliativa es un método encaminado a estudiar frotis de células descamadas de los epitelios. Principalmente de útero, bronquios y mucosa oral. Además resulta útil para material obtenido por punción o aspiración con aguja fina en órganos como: Mama, tiroides, riñón, páncreas, etc. así como líquidos de cavidades peritoneales, pleurales, líquido cefalorraquideo y orina.

PARÁMETROS A CUBRIR CADA UNO DE LOS COLORANTES

Papanicolaou EA – 50

Prueba de tinción en citología exfoliativa
Líquido verde fosforescente
Transmitancia: 522 nm 30 ± 6%
635 nm 70 ± 8%

Papanicolaou OG – 6

Prueba de tinción en citología exfoliativa
Solución rojiza y transparente

Hematoxilina	Prueba de tinción en citología exfoliativa Prueba de tinción en histología PH de la solución: 3,0 ± 0.8 Transmitancia : 560 nm 38 - 56

CONTRASTE CON LOS DIFERENTES COLORANTES:

Hematoxilina de harris	Coloración morado oscuro de los núcleos
Papanicolaou EA – 50	Citoplasma verde- azul
Papanicolaou 0G – 6	Citoplasma naranja - rosa

Envase y almacenamiento: Consérvese en su envase original de vidrio y cerrado herméticamente, no se exponga a temperaturas extremas, la manipulación directa puede contaminarla y almacene a temperatura ambiente entre 15-30 º C.

Clave: RCC-cd-01-02
RVFG/GME100826

Revisó y Aprobó: Gerente de Control de Calidad.
Servicio técnico disponible.

.